

Zorgen na een operatieve behandeling in uw mond

Kompres verwijderen

Bij het verwijderen van een tand wordt regelmatig een bijtgaasje achtergelaten op het wondje in uw mond. U moet na de ingreep een 30-tal minuten hierop blijven toebijten en u mag het daarna zelf verwijderen.

Hechtingen

Er wordt meestal gehecht met materiaal dat vanzelf verdwijnt. Algemeen genomen neemt dat proces een 2-tal weken in beslag.

De chirurg zal u verwittigen mocht er toch met niet-oplosbaar materiaal gehecht zijn en zal voor u dan een controle-afspraak voorzien.

Pijn

De verdoving is meestal na een 3 à 4-tal uren uitgewerkt. Het is raadzaam een pijnstillertje in te nemen alvorens de verdoving is uitgewerkt. Klassiek wordt Ibuprofen voorgeschreven. Deze pijnstillertje neemt men best in met de maaltijd en mag gecombineerd worden met Paracetamol.

Een klassieke extractie geeft een 5-tal dagen ongemak. De verwijdering van een ingesloten wijsheidstand kan een week tot tien dagen nalast geven.

Zwelling

Door de operatie kan de wang zwelling vertonen. Deze neemt klassiek toe in volume de eerste 48u na de ingreep. Nadien zal deze over verloop van een week tijd geleidelijk aan wegtrekken. Soms kan een blauwige verkleuring van de huid simultaan optreden, dewelke dan vervolgens geel wordt.

Nabloeding

Een forse nabloeding kan gestopt worden dmv het aanbrengen van een bijtgaasje op de wonde. Daarna dient het kompresje een 30-tal minuten ter plaatse te blijven door met redelijke kracht dicht te bijten. Belangrijk is dat u druk op de wonde uitoefent en absoluut niet gaat spoelen.

DR GRIET DE TEMMERMAN
DR BENEDIKTE LORRÉ
DR JAN NEVEN
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN
016 20 92 09

E-MAIL
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE
016 20 91 90

WEBSITE
WWW.MKA-LEUVEN.BE

Poetsen en spoelen

De dag van de ingreep worden de tanden best niet meer geïetst of gespoeld. De dag na de ingreep is het raadzaam de tanden opnieuw goed te poetsen en kan na het poetsen aanvullend gespoeld worden met een mondspoelmiddel. Na een week tot 10 dagen mag met het mondspoelmiddel gestopt worden.

Eten en drinken

Nadat de verdoving is uitgewerkt, zo een 4-tal uren na de ingreep, mag u eten en drinken. De dag zelf is het tegenaangewezen warm voedsel in te nemen: dit kan zorgen voor bloeding en meer zwelling. De dag na de ingreep kan opnieuw warm gegeten en gedronken worden.

Roken is nadelig voor de wondgenezing en wordt best vermeden tot 5 dagen na de ingreep.

Ijs

We adviseren de geopereerde regio te koelen door uitwendige ijsapplicatie de eerste 6 tot 8u. Dit om de zwelling zoveel als mogelijk te beperken. Het ijs hoeft niet continu aangelegd te worden, maar à ratio van 20 minuten per uur.

Contact opnemen

Het is verstandig contact op te nemen met de dienst MKA als:

- u koorts maakt boven de 39°C
- de pijn of de zwelling na een 5-tal dagen niet afneemt maar eerder toeneemt
- de wonde blijft bloeden, nadat meermaals een halfuur druk werd uitgeoefend op de wonde

Tussen 8u en 18u: 016/20 91 90

Buiten de diensturen kan u terecht op het nummer van de spoeddienst 016/20 92 80

DR GRIET DE TEMMERMAN
DR BENEDIKTE LORRÉ
DR JAN NEVEN
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN
016 20 92 09

E-MAIL
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE
016 20 91 90

WEBSITE
WWW.MKA-LEUVEN.BE