


Nazorg bij het vrijleggen van een geïmpacteerd element

Het doel van deze behandeling is de ingesloten tand ruimte te geven om door te breken en de orthodontist de mogelijkheid te geven om dmv een orthodontisch blokje de tand naar buiten te trekken.

Afhankelijk van de plaats van het vrijleggen zal er behandeld worden aan de kant van de lip of aan de kant van het gehemelte.



Het kan zijn dat de wonde met oplosbare hechtingen wordt gesloten. Deze hechtingen verdwijnen spontaan na een 2-tal weken.

Ook kan er soms een kauwgomachtig materiaal als wondverband worden aangebracht. Uw arts brengt u hiervan op de hoogte.

DR GRIET DE TEMMERMAN
DR BENEDIKTE LORRÉ
DR JAN NEVEN
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN
016 20 92 09

E-MAIL
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE
016 20 91 90

WEBSITE
WWW.MKA-LEUVEN.BE

Zorgen na de ingreep

Pijn en zwelling

De lokale verdoving is na een 4-tal uren uitgewerkt. Zorg dat u voor die tijd een pijnstiller heeft ingenomen. Meestal volstaat Ibuprofen in afwisseling met Paracetamol.

Door de ingreep kan de wang opzwellen. Deze zwelling neemt de eerste 48u toe. Nadien zal deze over verloop van een week tijd geleidelijk aan wegtrekken. Soms kan blauwige verkleuring van de huid simultaan optreden, dewelke dan vervolgens geel wordt. We adviseren de geopereerde regio te koelen door uitwendige ijsapplicatie de eerste 6 tot 8u. Dit om de zwelling zoveel als mogelijk te beperken. Het ijs hoeft niet continu aangelegd te worden, maar à ratio van 20 minuten per uur.

Bij behandeling aan het gehemelte kan u een waterijsje eten ter verkoeling.

Poetsen en spoelen

De dag van de ingreep worden de tanden best niet meer gepeetst of gespoeld. De dag na de ingreep is het raadzaam de tanden opnieuw goed te poetsen en kan na het poetsen aanvullend gespoeld worden met een mondspoelmiddel. Na een week tot 10 dagen mag met het mondspoelmiddel gestopt worden.

Eten en drinken

De dag zelf is het tegenaangewezen warm voedsel in te nemen: dit kan zorgen voor bloeding en meer zwelling. De dag na de ingreep kan opnieuw warm gegeten en gedronken worden.

Roken is nadelig voor de wondgenezing en wordt best vermeden tot 5 dagen na de ingreep.

Contact

Neem contact op met onze afdeling als u een van volgende klachten hebt:

- de bloeding stopt niet
- u maakt koorts van 38,5°C of meer
- de pijn of zwelling wordt na 4-5 dagen niet minder, maar neemt toe

DR GRIET DE TEMMERMAN
DR BENEDIKTE LORRÉ
DR JAN NEVEN
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN
016 20 92 09

E-MAIL
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE
016 20 91 90

WEBSITE
WWW.MKA-LEUVEN.BE