


Traitement consécutif à l'obturation d'une communication buco-naso-sinusienne

Traitement

Lors de l'extraction d'une dent au niveau de la mâchoire supérieure, le médecin BMV traitant demandera généralement de moucher légèrement le nez afin de créer de la pression au niveau des sinus. Le médecin pourra ainsi juger s'il y a une perforation ou non dans le fond des sinus, en raison de la présence d'une dent dont les longues racines atteindraient les sinus.

Dans pareil cas, on parle de communication ouverte entre la bouche et le sinus paranasal. Celle-ci doit être obturée afin d'éviter toute inflammation des sinus.



La plaie est généralement suturée à l'aide de fils qui se résorbent après environ deux semaines. Si vous n'avez pas bénéficié de fils résorbables, votre médecin vous en avertira et prévoira pour vous une visite de contrôle.

Soins consécutifs à l'intervention

Douleur et gonflement

Les effets de l'anesthésie locale disparaissent après 4 heures environ. Veillez à prendre un antidouleur dans ce laps de temps. Généralement, l'Ibuprofen suffit, en alternance avec du Paracetamol.

La joue peut gonfler des suites de l'intervention. Le gonflement augmente durant les premières 48 heures. Ensuite, il va diminuer progressivement en l'espace d'une semaine. Parfois, la peau peut prendre une coloration bleuâtre avant de virer au jaune. Nous vous recommandons de refroidir la zone opérée en appliquant de la glace durant les 6 à 8 premières heures suivant l'intervention. Ce afin de limiter au maximum le gonflement. La glace ne doit pas être appliquée en continu, mais à raison de 20 minutes par heure.

Nettoyage et rinçage

Le jour de l'intervention, il vaut mieux ne pas se brosser les dents, ni se rincer la bouche. Le jour suivant l'intervention, il est recommandé de recommencer à bien se brosser les dents. Une fois les dents brossées, on peut également rincer en faisant un bain de bouche. Après une semaine à 10 jours, le traitement par bain de bouche peut être arrêté.

Manger et boire

Le jour de l'intervention, il est déconseillé de manger des aliments chauds : cela peut engendrer des saignements et des gonflements. Le jour suivant l'intervention, vous pouvez de nouveau absorber des aliments et des liquides chauds.

Le tabagisme est mauvais pour la cicatrisation. Il est recommandé d'éviter de fumer jusqu'à 5 jours après l'intervention.

DR GRIET DE TEMMERMAN
DR BENEDIKTE LORRÉ
DR JAN NEVEN
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN
016 20 92 09

E-MAIL
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE
016 20 91 90

WEBSITE
WWW.MKA-LEUVEN.BE

Saignement de nez

Il est possible que votre nez saigne légèrement durant les premières heures. Afin que la plaie puisse guérir au mieux, il est très important qu'elle ne subisse aucune pression. **Vous ne pouvez donc pas moucher votre nez, souffler par celui-ci, le presser ou vous pencher durant les deux semaines suivant l'intervention.**

Contact

Prenez contact avec notre service si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :

- l'hémorragie ne s'arrête pas ;
- vous faites de la fièvre, 38,5 °C ou plus ;
- la douleur ou le gonflement ne s'atténuent pas 4-5 jours après l'intervention, mais augmentent ;
- vous avez une sensation de pression croissante en dessous des yeux ou une sensation de pression dans la joue ;
- vous observez des saletés s'écouler de votre nez ;
- de l'air ou du liquide passe de votre bouche dans votre nez.

DR GRIET DE TEMMERMAN
DR BENEDIKTE LORRÉ
DR JAN NEVEN
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN
016 20 92 09

E-MAIL
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE
016 20 91 90

WEBSITE
WWW.MKA-LEUVEN.BE