

Traitement consécutif à une résection apicale

Le but de ce traitement est d'enlever l'inflammation au niveau de l'extrémité de la racine (apex).

Lors de l'intervention, le canal de la racine est obturé avec un matériau d'obturation spécifique.



Geïnfecteerd of ontstoken weefsel	Tissu infecté ou enflammé
Tandvlees	Gencive
Kanaalvulling	Remplissage du canal
Dentine	Dentine
Bot	Os
Buitenkant wortel	Extérieur de la racine
Glazuur	Émail
Kroonvulling	Remplissage de la couronne
Opzij getrokken tandvlees	Déchaussement de la gencive
Verwijdering van geïnfecteerd weefsel	Élimination du tissu infecté
Verwijdering van wortelpunt	Élimination de l'apex
Hechting met draad	Suture à l'aide de fil
Mogelijke afsluiting van de wortelpunt	Obturation éventuelle de l'apex

La plaie est suturée à l'aide de fils résorbables qui disparaissent spontanément après environ deux semaines.

Soins consécutifs à l'intervention

Douleur et gonflement

Les effets de l'anesthésie locale disparaissent après 4 heures environ. Veillez à prendre un antidouleur dans ce laps de temps. Généralement, l'Ibuprofen suffit, en alternance avec du Paracetamol.

La joue peut gonfler des suites de l'intervention. Le gonflement augmente durant les premières 48 heures. Ensuite, il va diminuer progressivement en l'espace d'une semaine. Parfois, la joue peut prendre une coloration bleuâtre avant de virer au jaune. Nous vous recommandons de refroidir la zone opérée en appliquant de la glace durant les 6 à 8 premières heures suivant l'intervention. Ce afin de limiter au maximum le gonflement. La glace ne doit pas être appliquée en continu, mais à raison de 20 minutes par heure.

Nettoyage et rinçage

Le jour de l'intervention, il vaut mieux ne pas se brosser les dents, ni se rincer la bouche. Le jour suivant l'intervention, il est recommandé de recommencer à bien se brosser les dents. Une fois les dents brossées, on peut également rincer en faisant un bain de bouche. Après une semaine à 10 jours, le traitement par bain de bouche peut être arrêté.

Manger et boire

Le jour de l'intervention, il est déconseillé de manger des aliments chauds : cela peut engendrer des saignements et des gonflements. Le jour suivant l'intervention, vous pouvez de nouveau absorber des aliments et des liquides chauds.

Le tabagisme est mauvais pour la cicatrisation. Il est recommandé d'éviter de fumer jusqu'à 5 jours après l'intervention.

DR GRIET DE TEMMERMAN
DR BENEDIKTE LORRÉ
DR JAN NEVEN
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN
016 20 92 09

E-MAIL
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSSE
016 20 91 90

WEBSITE
WWW.MKA-LEUVEN.BE

Complications

Saignements

À l'issue du traitement, la salive peut être rougeâtre. Si la plaie saigne abondamment, mieux vaut prendre contact avec notre service. La plaie étant suturée, le risque de saignement est limité.

Infection

Si le gonflement ou la douleur augmentent 4-5 jours après l'intervention au lieu de diminuer, prenez contact avec notre service.

Contact

Prenez contact avec notre service si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :

- l'hémorragie ne s'arrête pas ;
- vous faites de la fièvre, 38,5 °C ou plus ;
- la douleur ou le gonflement ne s'atténuent pas 4-5 jours après l'intervention, mais augmentent.

DR GRIET DE TEMMERMAN
DR BENEDIKTE LORRÉ
DR JAN NEVEN
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN
016 20 92 09

E-MAIL
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE
016 20 91 90

WEBSITE
WWW.MKA-LEUVEN.BE