

## Traitement consécutif à la libération d'un élément inclus

L'objectif de ce traitement est de donner de l'espace à la dent incluse afin qu'elle perce et d'offrir à l'orthodontiste la possibilité de tirer la dent vers l'extérieur à l'aide d'un bloc orthodontique.

En fonction de l'emplacement de la libération, le traitement s'opèrera du côté de la lèvre ou du côté du palais.



Il se peut que la plaie soit suturée à l'aide de fils résorbables. Ces fils disparaissent spontanément après environ deux semaines.

Parfois, il arrive également qu'un matériau comparable à du chewing-gum soit utilisé pour panser la plaie. Votre médecin vous en tiendra informé(e).

## Soins consécutifs à l'intervention

### Douleur et gonflement

Les effets de l'anesthésie locale disparaissent après 4 heures environ. Veillez à prendre un antidouleur dans ce laps de temps. Généralement, l'Ibuprofen suffit, en alternance avec du Paracetamol.

La joue peut gonfler des suites de l'intervention. Le gonflement augmente durant les premières 48 heures. Ensuite, il diminuera progressivement en l'espace d'une semaine. Parfois, la peau peut prendre une coloration bleuâtre avant de virer au jaune. Nous vous recommandons de refroidir la zone opérée en appliquant de la glace durant les 6 à 8 premières heures suivant l'intervention. Ce afin de limiter au maximum le gonflement. La glace ne doit pas être appliquée en continu, mais à raison de 20 minutes par heure.

En cas de traitement au niveau du palais, vous pouvez manger une glace à l'eau afin de refroidir la zone.

### Nettoyage et rinçage

Le jour de l'intervention, il vaut mieux ne pas se brosser les dents, ni se rincer la bouche. Le jour suivant l'intervention, il est recommandé de recommencer à bien se brosser les dents. Une fois les dents brossées, on peut également rincer en faisant un bain de bouche. Après une semaine à 10 jours, le traitement par bain de bouche peut être arrêté.

### Manger et boire

Le jour de l'intervention, il est déconseillé de manger des aliments chauds : cela peut engendrer des saignements et des gonflements. Le jour suivant l'intervention, vous pouvez de nouveau absorber des aliments et des liquides chauds.

Le tabagisme est mauvais pour la cicatrisation. Il est recommandé d'éviter de fumer jusqu'à 5 jours après l'intervention.

DR GRIET DE TEMMERMAN  
DR BENEDIKTE LORRÉ  
DR JAN NEVEN  
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105  
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN  
016 20 92 09

E-MAIL  
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE  
016 20 91 90

WEBSITE  
WWW.MKA-LEUVEN.BE

## Contact

Prenez contact avec notre service si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :

- l'hémorragie ne s'arrête pas ;
- vous faites de la fièvre, 38,5 °C ou plus ;
- la douleur ou le gonflement ne s'atténuent pas 4-5 jours après l'intervention, mais augmentent.

DR GRIET DE TEMMERMAN  
DR BENEDIKTE LORRÉ  
DR JAN NEVEN  
DR JAN VANHOVE

NAAMSESTRAAT 105  
3000 LEUVEN

TELEFONISCHE AFSPRAKEN  
016 20 92 09

E-MAIL  
MKA@HHLEUVEN.BE

TELEFOON SECRETARESSE  
016 20 91 90

WEBSITE  
WWW.MKA-LEUVEN.BE